

**Gebrauchsinformation**

Dynexan® Zahnfleischtropfen

Wirkstoff: Aluminiumformiat 3·H<sub>2</sub>O

Zusammensetzung: 10 g Dynexan Zahnfleischtropfen (entsprechen 9,6 ml) enthalten: arzneilich wirksamer Bestandteil: 0,909 g Aluminiumformiat 3·H<sub>2</sub>O.

sonstige Bestandteile: Ethanol 96 % (v/v), Bitteres Fenchelöl, Gereinigtes Wasser, Macrogolglycerolhydroxystearat (Ph.Eur.), Nelkenöl, Propylenglykol, Sorbitol (Ph.Eur.), Zuckercouleur.

Darreichungsform des Arzneimittels Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle Packungsgrößen Flaschen mit 30 ml Lösung

Stoff- und Indikationsgruppe Traditionelles Arzneimittel

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller  
Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH  
Rheingastr. 87 – 93  
D-65203 Wiesbaden  
www.kreussler.com  
info@kreussler.com

**Anwendungsgebiete**

Dynexan Zahnfleischtropfen werden traditionell angewendet als mild wirkendes Arzneimittel bei leichten Entzündungen des Zahnfleisches und der Mundschleimhaut.

**Gegenanzeigen**

In welchen Situationen dürfen Sie Dynexan Zahnfleischtropfen nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht anwenden? Dynexan Zahnfleischtropfen dürfen nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen Dynexan Zahnfleischtropfen enthalten 12,4 Vol.-% Alkohol. Da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen, sollen Dynexan Zahnfleischtropfen bei Schwangeren, während der Stillzeit und bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln**

Es sind keine bekannt.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung**

Bitte halten Sie sich an die nachfolgenden Anwendungsvorschriften, da Dynexan Zahnfleischtropfen sonst nicht richtig wirken können.

Dynexan Zahnfleischtropfen werden verdünnt in der Mundhöhle angewendet. In welcher Menge und wie sollten Sie Dynexan Zahnfleischtropfen anwenden? Erwachsene und Kinder über 12 Jahre gurgeln, spülen oder betupfen die betroffenen Bereiche des Mundes mehrmals täglich. Geben Sie bei Zahnfleischbluten und Zahnfleischentzündung circa 10 bis 30 Tropfen in ein halbes Glas Wasser. Die Anwendung sollte nach den Mahlzeiten und dem Zähneputzen erfolgen.

Wie lange sollten Sie Dynexan Zahnfleischtropfen anwenden? Die Dauer der Anwendung richtet sich nach dem Verlauf der Erkrankung. Sollten bei Entzündungen des Zahnfleisches und der Mundschleimhaut die Beschwerden länger als 1 Woche andauern, ist ein Arzt aufzusuchen.

**Anwendungsfehler und Überdosierung**

Was ist zu tun, wenn Dynexan Zahnfleischtropfen in zu großer Menge angewendet wurden (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)? Vergiftungserscheinungen nach Schlucken von Konzentrat oder verdünnter Dynexan Zahnfleischtropfen – Lösung sind nicht bekannt. Eventuell können bei nicht bestimmungsgemäßer Aufnahme Magen-Darm-Beschwerden, wie z.B. Übelkeit und Erbrechen, auftreten. In diesem Fall verständigen Sie bitte Ihren Arzt.

**Nebenwirkungen**

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Dynexan Zahnfleischtropfen auftreten? Sehr selten (< 0,01 %, einschließlich Einzelfälle): allergische Reaktionen. Aufgrund des Gehaltes an Propylenglycol können Hautreizungen auftreten.

Sollten während der Anwendung von Dynexan Zahnfleischtropfen bei Ihnen unerwünschte Wirkungen auftreten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf dem Etikett und auf der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie bitte diese Packung nach dem Verfallsdatum nicht mehr. Ausfällungen sind möglich, haben aber keinen Einfluss auf die Wirksamkeit und Verträglichkeit von Dynexan Zahnfleischtropfen. Nicht über 25 °C aufbewahren Nach Anbruch sind Dynexan Zahnfleischtropfen 3 Monate haltbar.

Stand der Information Februar 2003