

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt oder Apotheker.

ALBICANSAN® D3 Salbe

Homöopathisches Arzneimittel · Wirkstoff: **Candida albicans D3**

Zusammensetzung:

1 g Salbe enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

0,10 g **Candida albicans D3** dil. (HAB, Vorschrift 5a, D1 mit gereinigtem Wasser).

Sonstige Bestandteile: 0,38 g Wollwachsalkoholsalbe

0,10 g mittelkettige Triglyceride, 0,03 g Glycerolmonostearat 40–50%

0,23 g Propylenglycol, 0,02 g Magnesiumsulfat · 7 H₂O

0,01 g Milchsäure, 0,13 g Wasser für Injektionszwecke.

Darreichungsform und Inhalt: 30 g / 300 g Salbe.



Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

SANUM-KEHLBECK
GmbH & Co. KG

Arzneimittelherstellung
Postfach 1355 · D-27316 Hoya

Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis an den Anwender: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Gegenanzeigen:

*Wann dürfen Sie **ALBICANSAN® D3** nicht anwenden?*

Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber Hefepilzen (**Candida albicans**)

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte **ALBICANSAN® D3** in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Was müssen Sie vor der Anwendung von **ALBICANSAN® D3** Salbe beachten?

Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen. Wollwachsalkoholsalbe kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflußt werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt nichts anderes verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da dieses Arzneimittel sonst nicht richtig wirken kann!

*Wieviel und wie oft sollten Sie **ALBICANSAN® D3** anwenden?*

Soweit nicht anders verordnet: 1 – 3mal täglich dünn auf die betroffenen Hautpartien auftragen.

*Wie lange sollten Sie **ALBICANSAN® D3** anwenden?*

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweis: Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: Das Verfalldatum ist auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Gebrauchsinformation: 01. 04. 2005.

Hinweis: Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel vor Wärme geschützt auf!

Zur weiteren Anwendung stehen **ALBICANSAN®** Injektionen, Tropfen, Kapseln, und Zäpfchen zur Verfügung.